

ПРОГИНОВА





Терапевтическая ниша	Обоснование назначения
<p>Задержка полового развития, обусловленная гипергонадотропным или необратимым гипогонадотропным гипогонадизмом.</p> <p>Обратимый гипогонадотропный гипогонадизм (аменорея на фоне потери массы тела, гипоталамическая аменорея, в том числе, стрессозависимая).</p>	<p>Аналоги натурального эстрадиола применяются для формирования женского фенотипа у лиц с нарушениями половой дифференцировки и/или отсутствием овариальной активности в сроки, соответствующие нормальному пубертату.</p> <p>Монотерапия препаратами эстрадиола используется для инициации пубертата у девушек с функциональной задержкой полового развития.</p> <p>Комбинированная эстроген-гестогенная терапия применяется в случаях вторичной аменореи гипоталамического происхождения после устранения причины нарушения менструальной функции.</p>
<p>Острое аномальное маточное кровотечение дисфункционального происхождения у девушек и молодых женщин.</p> <p>Регуляция менструального цикла у девушек с гипоестрогенной ановуляцией.</p>	<p>Прогинова — вариант выбора проведения гормонального гемостаза при АМК. Его преимущества перед КОК связаны с лучшей переносимостью и большей возможностью увеличения суточной дозы.</p> <p>Прогинова в комбинации с прогестогеном назначается в циклическом режиме подросткам с АМК на фоне низкой эстрогенной насыщенности.</p>
<p>Подготовка эндометрия к имплантации плодного яйца в циклах контролируемой индукции овуляции, экстракорпорального оплодотворения и других программах вспомогательных репродуктивных технологий.</p>	<p>В циклах стимуляции яичников, независимо от применяемого метода, Прогинова назначается для ускорения роста эндометрия под контролем УЗИ в индивидуальной подобранной дозе.</p> <p>Совместно с прогестогенами применяется для гормональной поддержки после переноса эмбриона. Используется для моделирования цикла у суррогатной матери.</p>
<p>Менопаузальная гормональная терапия у женщин с удаленной маткой.</p> <p>Компонент комбинированной менопаузальной гормональной терапии у женщин с интактной маткой.</p>	<p>Монотерапия препаратами эстрадиола — золотой стандарт лечения менопаузальных симптомов у женщин с отсутствующей маткой.</p> <p>Оральный прием в большинстве случаев более комфортен для женщин по сравнению с трансдермальным приемом.</p> <p>Рекомендуется женщинам, использующим в позднем репродуктивном периоде методы долговременной прогестогенной контрацепции (ЛНГ-ВМС, имплантаты), при появлении вазомоторных симптомов и других климактерических жалоб.</p>